

용법용량 변경대비표

변경 전	변경 후
<p>이 약의 치료 용량은 환자의 임상 상태에 따라 조절되어야 하며, 가능한 최소 유효량을 투여해야 한다.</p> <p>1. 성인</p> <p>미르타자핀으로서 초기용량은 1 일 15 mg 이며 적절한 임상효과가 나타날 때까지 용량을 증가시킬 필요가 있다. 1 일 유효용량은 보통 이 약으로서 15 ~ 45 mg 이다.</p> <p>2. 특이집단에서의 투여</p> <p>1) <u>신부전</u> 환자</p> <p>중등도에서 중증의 <u>신부전</u> 환자(크레아티닌청소율<40 mL/분)에서 이 약의 청소율이 감소할 수 있으므로 처방 시 주의해야 한다.</p> <p>2) <u>간부전</u> 환자</p> <p><u>간부전</u> 환자에서 이 약의 청소율이 감소할 수 있으므로 처방 시 주의한다. 특히, 중증의 <u>간부전</u> 환자에서는 연구되지 않았으므로 처방 시 주의해야 한다.</p> <p>3) 고령자</p> <p>추천용량은 성인과 동일하다. 용량을 증가 시킬 때 에는 만족스럽고 안전한 효과를 얻기 위해 세심한 관찰이 필요하다.</p> <p>4) <u>소아</u></p> <p>18 세 미만의 소아 및 청소년에 이 약을 사용하지 않는다.</p>	<p>이 약의 치료 용량은 환자의 임상 상태에 따라 조절되어야 하며, 가능한 최소 유효량을 투여해야 한다.</p> <p>1. 성인</p> <p>미르타자핀으로서 초기용량은 1 일 15 mg 이며 적절한 임상효과가 나타날 때까지 용량을 증가시킬 필요가 있다. 1 일 유효용량은 보통 이 약으로서 15 ~ 45 mg 이다.</p> <p>2. 특이집단에서의 투여</p> <p>1) <u>신장애</u> 환자</p> <p>중등도에서 중증의 <u>신장애</u> 환자(크레아티닌청소율<40 mL/분)에서 이 약의 청소율이 감소할 수 있으므로 처방 시 주의해야 한다.</p> <p>2) <u>간장애</u> 환자</p> <p><u>간장애</u> 환자에서 이 약의 청소율이 감소할 수 있으므로 처방 시 주의한다. 특히, 중증의 <u>간장애</u> 환자에서는 연구되지 않았으므로 처방 시 주의해야 한다.</p> <p>3) 고령자</p> <p>추천용량은 성인과 동일하다. 용량을 증가 시킬 때 에는 만족스럽고 안전한 효과를 얻기 위해 세심한 관찰이 필요하다.</p> <p>4) <u>소아 및 18 세 미만의 청소년</u></p> <p>두 개의 단기 임상시험을 통해 그 유효성이 입증되지 않았고, 안전성의 우려가 있으므로 소아 및 18세 미만의 청소년에 이 약을 사용하지 않는다(사용상 주의 사항 중 4. 이상반응 및 8. 소아 및 청소년에 대한 투여 참조)</p>